IbanUno (ibandronato de sódio). USO ADULTO. **APRESENTAÇÕES:** Comprimido revestido de 150 mg: embalagem com 1 comprimido. **INDICAÇÕES:** tratamento da osteoporose pós-menopausa, com a finalidade de reduzir o risco de fraturas vertebrais. **CONTRAINDICAÇÕES:** a pacientes com conhecida hipersensibilidade ao ibandronato de sódio, aos demais componentes da fórmula do produto e pacientes com hipocalcemia não corrigida. **CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS:** antes de iniciar o tratamento com IbanUno, deve-se tratar efetivamente a hipocalemia e outros distúrbios do metabolismo ósseo e mineral. A ingestão adequada de cálcio e vitamina D é importante para todos os pacientes. Os bisfosfonatos, administrados por via oral, em geral podem causar irritação local da mucosa gastrintestinal superior. Devido a esses possíveis efeitos irritantes e um potencial de agravamento da doença subjacente, cuidados devem ser tomados, quando administrado a pacientes com problemas ativos no trato gastrintestinal superior, como por exemplo: esôfago de Barrett, disfagia, outras doenças do esôfago, gastrite, duodenite ou úlceras). Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Categoria de risco na gravidez: B. IbanUno não deve ser utilizado por mulheres que estejam amamentando sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. **REAÇÕES ADVERSAS:** diarreia, dor abdominal, dor de cabeça, síndrome gripal, e mialgia. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** É provável que suplementos à base de cálcio, antiácidos, alguns medicamentos orais, alimentos ou produtos que contenham cálcio e/ou outros cátions multivalentes (tais como alumínio, magnésio e ferro) interfiram na absorção de IbanUno. Portanto, os pacientes devem esperar 60 minutos após ingerir IbanUno, antes de tomarem outros medicamentos orais. **POSOLOGIA:** a dose recomendada de IbanUno é um comprimido revestido de 150 mg, uma vez por mês. Os comprimidos devem ser tomados sempre na mesma data a cada mês. A dose máxima deste medicamento é 150 mg por mês. IbanUno deve ser administrado em jejum, 60 minutos antes da ingestão do primeiro alimento ou bebida do dia (exceto água) e antes da administração de qualquer outro medicamento ou suplemento, inclusive cálcio. Os comprimidos devem ser deglutidos inteiros, com um copo cheio de água filtrada (180 a 240 mL); o paciente deve estar em posição ereta: sentado, em pé ou andando. O paciente não deverá deitar-se nos 60 minutos seguintes após tomar o medicamento. IbanUno só deve ser tomado com água filtrada. ~~IbanUno~~ Não deve ser tomado com nenhum outro tipo de bebida, tais como água mineral, água com gás, café, chá, bebidas lácteas (como leite) ou suco. Algumas águas minerais podem conter altas concentrações de cálcio e, por isso, não devem ser utilizadas. Os comprimidos de IbanUno não devem ser mastigados nem chupados, pois podem causar ulceração na garganta. Registrado por: Supera Farma Laboratórios S.A. Avenida das Nações Unidas, 22532 bloco 1, Vila Almeida - São Paulo – SP CNPJ: 43.312.503/0001-05 - Indústria Brasileira. Farm. Resp.: Dra. Silmara Souza Carvalho Pinheiro. CRF-SP n° 37.843. Comercializado por: Supera RX Medicamentos Ltda. Pouso Alegre – MG**. REGISTRO MS Nº 1.0372.0294. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. ANTES DE PRESCREVER, RECOMENDAMOS A LEITURA DA BULA COMPLETA PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE O PRODUTO.**
Versão: 02-Bula:30/03/2021

CONTRAINDICAÇÃO: a pacientes com conhecida hipersensibilidade ao ibandronato de sódio, aos demais componentes da fórmula do produto. **INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA**: suplementos à base de cálcio.